

Uproszczony kalendarz szczepień u dzieci

WIEK	SZCZEPIENIE PRZECIW:
W ciągu 24 godz. po urodzeniu	Gruźlica (szczepionka BCG - śródskórnio)
	Wirusowe zapalenie wątroby typu B (domięśniowo)
2 m-c życia	Wirusowe zapalenie wątroby (domięśniowo)
	Błonica, Tężec, Krztusiec (tzw. Di-Per-Te – podskórnio)
	Choroba Heinego-Medina (doustnie)
3/4 m-c życia	Błonica, Tężec, Krztusiec (tzw. Di-Per-Te – podskórnio)
	Choroba Heinego-Medina (doustnie)
5 m-c życia	Błonica, Tężec, Krztusiec (tzw. Di-Per-Te – podskórnio)
	Choroba Heinego-Medina (doustnie)
12 m-c życia	Wirusowe zapalenie wątroby (domięśniowo)
	Gruźlica (szczepionka BCG – śródskórnio)
13 – 14 m-c życia	Odra (domięśniowo) można też podać szczepionkę potrójną przeciw odrze + śwince + różyczce. Szczepienie potrójną szczepionką jest odpłatne
16 – 18 m-c życia	Błonica, Tężec, Krztusiec (tzw. Di-Per-Te – podskórnio)
	Choroba Heinego-Medina (doustnie)
6 rok życia	Błonica, Tężec, Krztusiec (tzw. Di-Per-Te – podskórnio)
	Choroba Heinego-Medina (doustnie)
7 rok życia	Odra (podskórnio)
	Gruźlica (szczepionka BCG – śródskórnio)
11 rok życia	Choroba Heinego-Medina (doustnie)
12 rok życia	Gruźlica (szczepionka BCG – śródskórnio)
13 rok życia	Różyczka (podskórnio). Tylko dziewczynki, ponieważ zakażenie różyczką w czasie ciąży grozi wadami płodu
14 rok życia	Błonica, Tężec (Di-Te – podskórnio)
18 rok życia	Gruźlica (szczepionka BCG – śródskórnio)
19 rok życia	Błonica, Tężec (Di-Te – podskórnio)